

**DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO
per effettuazione Test di Mantoux**

Il/La sottoscritto/a

Dichiara di essere stato informato che:

- Il test "Intradermoreazione alla tubercolina (Mantoux)" è utile ai fini diagnostici dell'infezione tubercolare
- Il test consiste nell'iniezione di 0,1 ml di soluzione di tubercolina nel derma dell'avambraccio
- Immediatamente dopo l'esecuzione del test è necessario aspettare 10 minuti prima di lasciare l'ambulatorio
- La lettura della reazione viene eseguita dopo 48/72 ore
- Il test è controindicato in caso di allergia a uno dei componenti (PPD, Tween 80, fenolo, soluzione salina tamponata), o di reazione allergica in un precedente test tubercolinico
- In caso di risultato positivo sarà necessario effettuare prelievo di sangue per test IGRA (Quantiferon)

- Gli eventuali effetti collaterali consistono in:

SINTOMO	FREQUENZA
prurito, eritema, dolore	Frequente in caso di reattività
Nel punto di iniezione: comparsa di vescicola, ulcera, necrosi	Raro (solo in caso di reattività molto spiccata)
Reazioni allergiche generalizzate: rash cutaneo immediato o eruzione generalizzata nelle 24 ore successive	Molto raro
Reazioni di ipersensibilità grave fino alla reazione anafilattica	Eccezionale

Data: _____ Firma: _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della Sorveglianza Sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/08